

Xylonor Spray N 15%, Dentallösung

Wirkstoff: Lidocain

Apothekenpflichtig

Zusammensetzung: 1 g Dentallösung enthält 0,15 g Lidocain.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Ethanol 96 %.

Sonstige Bestandteile: Saccharin, natürliches Minzaroma, Dipropylenglykol-Isomerengemisch,

Anwendungsgebiete: Zur Anästhesierung der Einstichstelle vor Injektionen in die Mundschleimhaut. Zur Oberflächenanästhesie bei Extraktion gelockerter Milchzähne. Zur Inzision oberflächlicher submuköser Abszesse. Xylonor Spray N 15%, Dentallösung ist bei Erwachsenen und bei Kindern und Jugendlichen von 5 bis 18 Jahre angezeigt.

Gegenanzeigen:

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Lidocain oder einen der sonstigen Bestandteile oder andere Lokalanästhetika vom Säureamid-Typ darf Xylonor Spray N 15% nicht angewendet werden. Xylonor Spray N 15% darf außerdem nicht angewendet werden bei schweren Störungen des Reizbildungs- und Reizleitungssystems am Herzen, akuter dekompensierter Herzinsuffizienz (akutes Versagen der Herzleistung) sowie bei kardiogenem und hypovolämischen Schock.

Nebenwirkungen:

Blässe, Hypotonie, Myokardschwäche, Bradykardie, Herzstillstand, anaphylaktische Kreislaufreaktionen; Erregung, Depression, Nervosität, Schwindel, Sehstörungen, Kribbeln und Taubheitsgefühl im Bereich der Mundhöhle, Zittern, Abgeschlagenheit, Krämpfe, Bewusstlosigkeit, Atemstillstand; Urtikaria, Ödeme; Bronchospasmus

Warnhinweise:

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Enthält 44 Vol.-% Alkohol.

SEPTODONT GmbH, Felix-Wankel-Str. 9, D-53859 Niederkassel

06-2015