PAROEX 1,2 mg/ml, Mundwasser

Wirkstoff: Chlorhexidindigluconat

Zusammensetzung: Jeder ml enthält 1,2 mg Chlorhexidindigluconat.

Sonstige Bestandteile: Glycerol, Acesulfam-Kalium, Macrogolglycerolhydroxystearat., Propylenglykol, Azorubin (E122), Minze-Aroma, flüssig, Optamint, 257515*, Gereinigtes Wasser.

*Zusammensetzung Aromastoff: Menthol, Anethol, Eucalyptol, Pfefferminzöl, Menthon Menthylacetat, racemisches Menthol, Propylenglykol, Triacetin, ätherisches Sternanis-Öl, ätherisches Geranien-Öl, Vanillin, Maltol, essentielles Mandarinenöl, Ethanol.

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei Mundschleimhautinfektionen und zur postoperativen Versorgung in der Stomatologie.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidindigluconat oder einen der sonstigen Bestandteile.

Warnhinweise: Enthält Azorubin (E122), Macrogolglycerolhydroxystearat, Propylenglycol. Bitte Packungsbeilage beachten.

Nebenwirkungen:

Gelegentlich: reversible bräunliche Verfärbung der Zähne, des Zahnersatzes und der Zungenoberfläche (kann durch reduzierten Konsum von Tee, Kaffee und Rotwein verhindert werden).

Selten: verstärkte Zahnsteinbildung, Zahnfleischbluten nach dem Zähneputzen (bei regelmäßiger Anwendung), Überempfindlichkeitsreaktionen.

Sehr selten: Reizung der Mundschleimhaut, reversible desquamative Veränderungen der Schleimhaut, schwere allergische Reaktionen mit Symptomen wie Bronchospasmus, Dyspnoe, Periorbitalödem, Hypotonie und Schock, einschließlich Anaphylaxie nach lokaler Anwendung von Chlorhexidin.

Häufigkeit nicht bekannt: Parotitis, Dysgeusie *, Zungenparästhesie / Hypästhesie * (brennendes Gefühl, Beeinträchtigung des Geschmackseindrucks oder Taubheit), allergische Kontaktdermatitis.

*Diese reversiblen Symptome verbessern sich im Allgemeinen während der Anwendung von PAROEX 1,2 mg / ml, Mundwasser. Wenn die Symptome nach Beendigung der Behandlung immer noch bestehen, ist ein Arzt oder Apotheker aufzusuchen.

SUNSTAR FRANCE; 55/63, rue Anatole France; 92300 LEVALLOIS PERRET; FRANKREICH