



Oraqix®

Lidocain und Prilocain Parodontal-Gel 2,5%/2,5%

# Lokalanästhesie ohne Spritze


THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

 Dentsply  
Sirona

Oraqix®

Lidocain und Prilocain Parodontal-Gel 2,5%/2,5%

Ein gutes Gefühl  
nichts zu fühlen.



## Indikation und Anwendung

Oraqix® ist geeignet für die subgingivale Lokalanästhesie bei erwachsenen Patienten. Es ist eine lokale Schmerzkontrolle, die bei der Initial- oder Recallbehandlung von Zahnfleischerkrankungen, wie zum Beispiel Parodontitis verwendet wird.

## Produkteigenschaften

Oraqix® ist ein lokal subgingival aufzutragendes Anästhesie-Gel, das aus einer eutektischen Mischung von 2,5% Lidocain und 2,5% Prilocain in einem thermoplastischen System besteht. Es wird flüssig aufgetragen und verändert sich in der Parodontaltasche zu einem Gel.

- Leichter Zugang durch eine stumpfe Kanüle, vergleichbar mit einer PA-Sonde
- Injektionsfrei
- Neue thermoplastische Zusammensetzung
- Wirkungseintritt in 30 Sekunden
- Wirkungsdauer ca. 20 Minuten
- Flexible Dosierbarkeit – zur Behandlung einzelner Parodontaltaschen, Quadranten oder Kiefer
- Wiederholbare Anwendung – Höchstdosis 5 Patronen (8,5 g Gel)
- Aufbewahrung bei Raumtemperatur

## Kontraindikationen

- Oraqix® ist kontraindiziert bei Patienten, die überempfindlich auf Lokalanästhetika vom Amid-Typ oder auf andere Komponenten des Produktes reagieren
- Oraqix® darf nicht injiziert werden!

## Unerwünschte Wirkungen

Die in allen klinischen Studien am häufigsten beobachteten unerwünschten Ereignisse bestanden in lokalen Reaktionen der Mundhöhle. Es konnten keine Nebenwirkungen spezifisch auf Oraqix® zurückgeführt werden. Gegenüber Injektionsanästhetika kam es deutlich seltener zu posttherapeutischen Problemen wie Taubheitsgefühl, Wundgefühl und Schmerzen.


Positive Bewertung von Oraqix® durch 10 deutsche Universitäten:  
**65% der Patienten bevorzugen Oraqix®**  
 gegenüber der herkömmlichen Injektion.<sup>1</sup>

- ➔ APPLIKATION IN DIE PARODONTALTASCHE
- ➔ EFFEKTIVE SCHMERZAUSSCHALTUNG<sup>2</sup>
- ➔ KEINE RESTTAUBHEIT NACH DER BEHANDLUNG<sup>3</sup>

## Anleitung für maximalen Patientenkomfort



Bei schmerzempfindlichen Patienten Oraqix® mit einer stumpfen Kanüle am Gingivalrand auftragen und 30 Sekunden warten.



Vom Taschenboden beginnend bis zum Sulkusrand ausreichend mit Oraqix® auffüllen, bis das Gel sichtbar wird. Nicht direkt an der PA-Tasche absaugen. Nach 30 Sekunden kann die Behandlung gestartet werden.



Prüfung der Anästhesiewirkung durch Sondieren. Wirkungsdauer ca. 20 Minuten.

## Oraqix® Dispenser

- Der Oraqix® Dispenser ist bestimmt für das Auftragen des Oraqix®-Gel – für andere Lokalanästhesieprodukte ist er nicht geeignet
- Einfacher Zugang durch die stumpfe Kanüle, vergleichbar mit einer PA-Sonde – die Oraqix® Kanüle kann zusätzlich gebogen und gedreht werden
- Sterilisierbar
- Leichte Vorbereitung
- Praktische Dosiermechanik



<sup>1</sup> Lowden, C.E. et al, J Dent Res 2008; 84: Special Issue, abstr. #1561.

<sup>2</sup> Magnusson, I et al, J Periodontol May 2003; 74:597-602; Jeffcoat, M et al, J Periodontol July 2001; 72:895-900.

<sup>3</sup> Moschos, I. et al, Dtsch Zahnärztl Z. May 2008; 63: 337-342.

# Was Sie wissen müssen

- Schneller Wirkungseintritt, nach 30 Sekunden
- Ausreichende Wirkungsdauer, 20 Minuten
- Großes Sicherheitsfenster, reapplizierbar (max. 5 Patronen/8,5 g Gel)
- Flexible Dosierbarkeit, einzelne PA-Taschen, Quadranten oder Kiefer
- Gleicher Behandlungserfolg (ermittelt über die Sondiertiefen und den Attachmentgewinn) wie bei herkömmlicher Anästhesie nachgewiesen<sup>4,5</sup>
- Für Initial- und Recallbehandlungen

# Was Ihr Patient wissen sollte

- Keine Angst, weil Applikation ohne Spritze
- Kein Injektionsschmerz, dadurch weniger Stress
- Kein Taubheitsgefühl und deshalb keine Alltagseinschränkungen nach der Behandlung

<sup>4</sup> Termaat SHM et al., J Dent Res 2008, 84, Special Issue, abstr. # abstr. 2181.

<sup>5</sup> Derman SHM, Lowden CE, Hellmich M, Noack MJ. Influence of intra-pocket anesthesia gel on treatment outcome in periodontal patients: a randomized controlled trial. J Clin Periodontol 2014; 41: 481-488. doi: 10.1111/jcpe.12239.

# Bestellinformationen

## Oraqix® Nachfüllpackung 663.12.020 DE

20 Patronen à 1,7 g Gel,  
20 stumpfe Kanülen



## Oraqix® Dispenser 66420

Sterilisierbar, leichte Vorbereitung,  
praktische Dosiermechanik.



Oraqix® Parodontal-Gel. Zusammensetzung: Ein Gramm enthält 25 mg Lidocain und 25 mg Prilocain. Sonstige Bestandteile: Poloxamer 188, gereinigt. Poloxamer 407, gereinigt. Verdünnte Salzsäure zur pH-Einstellung. Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Oraqix® ist bei Erwachsenen zur lokalen Anästhesie in Parodontaltaschen bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen wie Sondieren, Zahnsteinentfernung und/oder Wurzelglättung angezeigt. Gegenanzeigen: Oraqix® ist bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber Lidocain, Prilocain, anderen Lokalanästhetika vom Amid-Typ oder einem der sonstigen Bestandteile kontraindiziert, ebenso bei Patienten mit kongenitaler oder idiopathischer Methämoglobinämie oder rezidivierender Porphyrie. Warnhinweise: Oraqix® darf nicht injiziert werden. Nebenwirkungen: Es konnten keine Nebenwirkungen spezifisch auf Oraqix® zurückgeführt werden. Die in allen klinischen Studien am häufigsten aufgetretenen unerwünschten Ereignisse bestanden in lokalen Reaktionen in der Mundhöhle. Häufigkeit und Art der Begleiterscheinungen waren bei Oraqix® bzw. Placebo vergleichbar. Methämoglobinämie: Prilocain kann erhöhte Methämoglobin-Spiegel induzieren, die zu einer Zyanose führen können. Im Rahmen der klinischen Studien mit Oraqix® wurde nicht über Methämoglobinämie berichtet. In seltenen Fällen wurden Lokalanästhetika mit allergischen Reaktionen (in den schwersten Fällen mit einem anaphylaktischen Schock) in Verbindung gebracht. Während der klinischen Studien mit Oraqix® wurde nicht über allergische Reaktionen berichtet. Art und Inhalt des Behältnisses: Glaspatrone mit 1,7 g Gel. Pharmazeutischer Unternehmer: Dentsply DeTrey GmbH, 78467 Konstanz, Deutschland. Stand der Information: Dezember 2004. Apothekenpflichtig.

## Dentsply Sirona Deutschland GmbH

Fabrikstr. 31  
64625 Bensheim  
DEUTSCHLAND

dentsplysirona.com · pre@dentsplysirona.com  
Service-Line für Deutschland: 08000-735000 (gebührenfrei)  
Service-Line für Schweiz und Österreich: 00800-00735000 (gebührenfrei)

Besuchen Sie uns auf [f facebook.com/dentsplysirona](https://www.facebook.com/dentsplysirona)

K79100892-05  
© Dentsply Sirona 11/2019